



12.º Ano de Escolaridade | Turma G-K

CADERNO 1

1. .

1.1. P2001/2002

$$P(\text{sair face nacional}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{sair face europeia}) = \frac{1}{2}$$

Portanto,

$$P(\text{pedida}) = {}^{20}C_{10} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \approx 0.18$$

Resposta:(C)

1.2. PMC2015

$$\begin{aligned} \text{O período do oscilador é } \tau &= \frac{45}{4} - \frac{21}{4} = \frac{24}{4} = 6 \\ \text{assim, } \frac{2\pi}{\alpha} &= 6 \Leftrightarrow \alpha = \frac{2\pi}{6} \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} \\ \text{e a frequência é } f &= \frac{1}{\tau} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Resposta:(C)

2. .

2.1. Determinemos uma equação do plano ABC

Um vetor normal ao plano poderá ser um vetor diretor da reta que contém a altura da pirâmide, ou seja, poderá ser $\vec{\alpha} = (0; 6; 6)$

assim, $ABC : 0x + 6y + 6z + d = 0, d \in \mathbb{R}$

Como $T\left(1, \frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$ é um ponto deste plano, vem,

$$6 \times \frac{1}{2} + 6 \times \frac{3}{2} + d = 0 \Leftrightarrow 3 + 9 + d = 0 \Leftrightarrow d = -12$$

Logo, $ABC : 6y + 6z - 12 = 0$, ou seja, $ABC : y + z - 2 = 0$

Determinemos, agora o ponto S , de interseção deste plano com a reta que contém a altura da pirâmide

Ora, um ponto genérico da reta é $(2; -2 + 6k; -2 + 6k), k \in \mathbb{R}$

Assim, substituindo na equação do plano, vem,

$$ABC : -2 + 6k - 2 + 6k - 2 = 0 \Leftrightarrow 12k - 6 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{1}{2}$$

Portanto,

$$S\left(2; -2 + 6 \times \frac{1}{2}; -2 + 6 \times \frac{1}{2}\right), \text{ ou seja, } S(2; 1; 1)$$

Ora, $\overline{BC} = \overline{AD} = 4$

Determinemos a medida do lado $[AB]$ da base da pirâmide

$$\overline{BS} = \sqrt{(0-2)^2 + (0-1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{6}$$

Logo, $\overline{BD} = 2\sqrt{6}$

Aplicando o Teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo $[ABD]$ vem,

$$\overline{BD}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AD}^2 \Leftrightarrow \overline{AB}^2 = (2\sqrt{6})^2 - 4^2 \Leftrightarrow \overline{AB}^2 = 24 - 16 \Leftrightarrow \overline{AB}^2 = 8 \Leftrightarrow \overline{AB} = \pm\sqrt{8},$$

e $\overline{AB} > 0$, logo, $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$

$$\text{A medida da altura da pirâmide é } \overline{VS} = \sqrt{(2-2)^2 + (4-1)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

Assim,

$$V_{pirâmide} = \frac{1}{3} \times \overline{BC} \times \overline{AB} \times \overline{VS} = \frac{1}{3} \times 4 \times 2\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} = 16 \text{ u.v.}$$

2.2. A condição $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CP} = 0$ define a superfície esférica de diâmetro $[AC]$

2.3. O número de casos possíveis é igual a 8^5 , pois temos oito cores disponíveis para colorir cinco faces da pirâmide

Quanto ao número de casos favoráveis: Para colorir duas faces opostas, com a mesma cor, temos oito cores disponíveis. Escolhida essa cor, as restantes faces podem ser coloridas de 7A_3 maneiras distintas. Tendo em conta que temos dois pares de faces opostas, então, o número de casos favoráveis é igual a $8 \times {}^7A_3 \times 2$

$$\text{Assim, } P(\text{pedida}) = \frac{8 \times {}^7A_3 \times 2}{8^5} = \frac{105}{1024}$$

3. .

3.1. A Ana tem oito escolhas para se sentar à mesa. Para cada uma dessas escolhas, o Pedro só tem um escolha, dado que tem de ficar sentado em frente da Ana. Assim a Ana e o Pedro podem sentar-se um em frente ao outro de oito maneiras distintas. Para cada uma destas maneiras, os restantes oito amigos podem sentar-se de $8!$ maneiras distintas

Resumindo, os dez elementos podem sentar-se à mesa de $8 \times 8! = 322560$ maneiras distintas

Resposta:(A)

3.2. Sejam os acontecimentos

A: "ser mulher"

B: "ter mota própria"

Dos dados, tem-se,

$$P(A) = \frac{1}{5}$$

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$P(B | A) = \frac{1}{4}$$

$$P(\overline{B} | \overline{A}) = \frac{1}{4}$$

Pretende-se o valor de $P(\overline{A} | B)$

Ora,

$$\begin{aligned}
 P(B | A) = \frac{1}{4} &\Leftrightarrow \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow P(B \cap A) = \frac{1}{4} \times P(A) \Leftrightarrow P(B \cap A) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{5} \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow P(B \cap A) = \frac{1}{20} \\
 P(\overline{B} | \overline{A}) = \frac{1}{4} &\Leftrightarrow \frac{P(\overline{B} \cap \overline{A})}{P(\overline{A})} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow P(\overline{B} \cap \overline{A}) = \frac{1}{4} \times P(\overline{A}) \Leftrightarrow P(\overline{B} \cup \overline{A}) = \frac{1}{4} \times \frac{4}{5} \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow 1 - P(B \cup A) = \frac{1}{5} \Leftrightarrow 1 - [P(B) + P(A) - P(B \cap A)] = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow 1 - P(B) - P(A) + P(B \cap A) = \frac{1}{5} \Leftrightarrow 1 - P(B) - \frac{1}{5} + \frac{1}{20} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow -P(B) + \frac{4}{5} + \frac{1}{20} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow P(B) = \frac{4}{5} + \frac{1}{20} - \frac{1}{5} \Leftrightarrow P(B) = \frac{13}{20}
 \end{aligned}$$

Portanto,

$$P(\overline{A} | B) = \frac{P(\overline{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{13}{20} - \frac{1}{20}}{\frac{13}{20}} = \frac{12}{13}$$

4. $f(0) = e^0 + 0^2 = 1$, logo, $A(0; 1)$
 $f(1) = e^{-1} + 1^2 = \frac{1}{e} + 1$, logo, $B\left(1; \frac{1}{e} + 1\right)$

$f'(x) = (e^{-x} + x^2)' = -e^{-x} + 2x$
logo, $f'(c) = -e^{-c} + 2c$ é o declive da reta tangente ao gráfico no ponto C

$$m_{AB} = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{\frac{1}{e} + 1 - 1}{1} = \frac{1}{e}, \text{ é o declive da reta secante } AB$$

Assim, deverá ter-se,

$$f'(c) = m_{AB}$$

Portanto, vem,

$$-e^{-c} + 2c = \frac{1}{e}$$

Inserir as funções:


$$y_1 = -e^{-c} + 2c$$

$$y_2 = \frac{1}{e}$$

Desenhar os gráficos das duas funções

Procurar a abcissa do ponto de interseção dos dois gráficos

Tem-se, $c \approx 0.49$



5. $w = 2 \sin(\alpha) + 2i \cos(\alpha) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + 2i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = 2e^{i(\frac{\pi}{2} - \alpha)}$
 então,
 $iw^3 = e^{i\frac{\pi}{2}} \times \left[2e^{i(\frac{\pi}{2} - \alpha)}\right]^3 = e^{i\frac{\pi}{2}} \times 2^3 \times e^{i(\frac{3\pi}{2} - 3\alpha)} = 8e^{i(\frac{3\pi}{2} + \frac{3\pi}{2} - 3\alpha)} = 8e^{i(2\pi - 3\alpha)} =$
 $= 8 \cos(2\pi - 3\alpha) + 8i \sin(2\pi - 3\alpha) = 8 \cos(3\alpha) - 8i \sin(3\alpha)$

iw^3 é solução da condição $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(z)$, se e só se,

$$\begin{aligned} 8 \cos(3\alpha) = -8 \sin(3\alpha) &\Leftrightarrow \cos(3\alpha) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + 3\alpha\right) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3\alpha &= \frac{\pi}{2} + 3\alpha + 2k\pi \vee 3\alpha = -\frac{\pi}{2} - 3\alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \text{equação impossível } \vee 6\alpha &= -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \alpha = -\frac{\pi}{12} + \frac{1}{3}k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Atribuindo valores a k

$$\begin{aligned} k = 0 \Rightarrow \alpha &= -\frac{\pi}{12} \notin \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\\ k = 1 \Rightarrow \alpha &= -\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{12} = \frac{\pi}{4} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\\ k = 2 \Rightarrow \alpha &= -\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi}{3} = \frac{7\pi}{12} \notin \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\\ \text{Logo, } \alpha &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Resposta:(B)

6. Seja r a razão da progressão geométrica

Então,

$$r^3 = \frac{a_7}{a_4} \Leftrightarrow r^3 = \frac{131072}{256} \Leftrightarrow r^3 = 512 \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{512} \Leftrightarrow r = 8$$

Logo, a razão da progressão geométrica é 8

$$r^6 = \frac{a_7}{a_1} \Leftrightarrow 8^6 = \frac{131072}{a_1} \Leftrightarrow 262144 = \frac{131072}{a_1} \Leftrightarrow a_1 = \frac{131072}{262144} \Leftrightarrow a_1 = \frac{1}{2}$$

Assim,

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{585}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \times \frac{1 - 8^n}{1 - 8} = \frac{585}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \times \frac{8^n - 1}{7} = \frac{585}{2} \Leftrightarrow 8^n - 1 = 7 \times 585 \Leftrightarrow 8^n - 1 = 4095 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 8^n &= 4096 \Leftrightarrow 8^n = 8^4 \Leftrightarrow n = 4 \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Logo, $n = 4$

7. Comecemos por determinar o raio do círculo

$$\overline{AE} = \sqrt{(-7 + 2\sqrt{3} + 7)^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{12 + 4} = 4$$

A condição que define o círculo é $|z - (-7 + 2i)| \leq 4$, ou seja, $|z + 7 - 2i| \leq 4$

O semiplano é definido por $y \geq 4$, ou ainda, $\operatorname{Im}(z) \geq 4$

Assim, a condição que define a região colorida é $|z + 7 - 2i| \leq 4 \wedge \operatorname{Im}(z) \geq 4$

Resposta:(C)

CADERNO 2

8. .

8.1. P2001/2002

Ora,

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + a + b + \frac{1}{3} = 1 \wedge b = 3a &\Leftrightarrow \frac{11}{12} + a + 3a = 1 \wedge b = 3a \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4a = 1 - \frac{11}{12} \wedge b = 3a &\Leftrightarrow 4a = \frac{1}{12} \wedge b = 3a \Leftrightarrow a = \frac{1}{48} \wedge b = 3a \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow a = \frac{1}{48} \wedge b = 3 \times \frac{1}{48} &\Leftrightarrow a = \frac{1}{48} \wedge b = \frac{1}{16} \end{aligned}$$

Logo, $P(X = 3) = \frac{1}{16}$

Resposta:(D)

8.2. PMC2015

$$9x^2 + 16y^2 = 144 \Leftrightarrow \frac{9x^2}{144} + \frac{16y^2}{144} = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

Assim,

$a^2 = 16 \Leftrightarrow a = \pm 4$, e como $a > 0$, vem, $a = 4 \Rightarrow$ medida do semieixo maior
 $b^2 = 9 \Leftrightarrow b = \pm 3$, e como $b > 0$, vem, $b = 3 \Rightarrow$ medida do semieixo menor

$a^2 = b^2 + c^2 \Leftrightarrow 16 = 9 + c^2 \Leftrightarrow 16 - 9 = c^2 \Leftrightarrow c = \pm\sqrt{7}$,
e como $c > 0$, vem, $c = \sqrt{7} \Rightarrow$ medida da semidistância focal

Portanto,

$A(4;0)$, $B(0;3)$, $D(0;-3)$ e $C(-\sqrt{7};0)$

Logo,

$$A_{[ABCD]} = 2 \times \frac{\overline{AC} \times \overline{OB}}{2} = (4 + \sqrt{7}) \times 3 = (12 + 3\sqrt{7}) \text{ u.a.}$$

Resposta:(D)

$$\begin{aligned} 9. \quad w &= \frac{(1-i) \times i^{19}}{1 + \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)^5} = \frac{(1-i) \times i^{4 \times 4 + 3}}{1 + (0+i)^5} = \frac{(1-i) \times i^3}{1 + i^5} = \frac{(1-i) \times (-i)}{1 + i^{1 \times 4 + 1}} = \\ &= \frac{-i + i^2}{1+i} = \frac{-1-i}{1+i} = \frac{-(1+i)}{1+i} = -1 \end{aligned}$$

Logo, $w = e^{i\pi}$

Assim, tem-se que o afixo de w situa-se numa circunferência de centro na origem e raio 1
Portanto, como o hexágono está inscrito nessa circunferência, a medida do seu lado é igual ao
raio, ou seja, é igual a um

Resumindo,

o perímetro do hexágono é igual a 6 u.c.

10. .

10.1. P2001/2002

Um vetor diretor da reta r é $\vec{r} = (2; 3; 0)$ e um vetor normal ao plano α é $\vec{\alpha} = (2; 0; 3)$

Ora,

$\vec{r} \cdot \vec{\alpha} = 2 \times 2 + 3 \times 0 + 0 \times 3 = 4 \neq 0$, logo a reta, não é paralela ao plano nem está contida no plano

Existirá $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, tal que $\vec{r} = k \vec{\alpha}$?

$$\begin{aligned}\vec{r} = k \vec{\alpha} &\Leftrightarrow (2; 3; 0) = k \times (2; 0; 3) \Leftrightarrow (2; 3; 0) = (2k; 0; 3k) \Leftrightarrow 2 = 2k \wedge 3 = 0k \wedge 0 = 3k \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow k = 1 \wedge 3 = 0k \wedge k = 0\end{aligned}$$

Este sistema é impossível, logo os vetores $\vec{\alpha}$ e \vec{r} não são colineares, o que faz com que a reta r não seja perpendicular ao plano α

Portanto, a reta é oblíqua ao plano

Resposta:(B)

10.2. PMC2015

$$\begin{aligned}f(-1) &= \arcsin\left(-1 - \frac{-1}{2}\right) + 2\arccos(-1) = \arcsin\left(-1 + \frac{1}{2}\right) + 2\pi = \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) + 2\pi = \\ &= -\frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{11\pi}{6}\end{aligned}$$

Resposta:(B)

11. Calculemos a função derivada de f

$$\begin{aligned}f'(x) &= [35 - 5(e^{0.03x} + e^{-0.03x})]' = 0 - 5 \times (e^{0.03x} + e^{-0.03x})' = -5 \times (0.03e^{0.03x} - 0.03e^{-0.03x}) = \\ &= -5 \times (0.03e^{0.03x} - 0.03e^{-0.03x})\end{aligned}$$

Determinemos os zeros de f'

$$\begin{aligned}f'(x) = 0 &\Leftrightarrow -5 \times (0.03e^{0.03x} - 0.03e^{-0.03x}) = 0 \Leftrightarrow 0.03e^{0.03x} - 0.03e^{-0.03x} = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 0.03e^{0.03x} = 0.03e^{-0.03x} \Leftrightarrow e^{0.03x} = e^{-0.03x} \Leftrightarrow 0.03x = -0.03x \Leftrightarrow 0.03x + 0.03x = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 0.06x = 0 \Leftrightarrow x = 0\end{aligned}$$

Sinal de f'

$$\begin{aligned}f'(x) > 0 &\Leftrightarrow -5 \times (0.03e^{0.03x} - 0.03e^{-0.03x}) > 0 \Leftrightarrow 0.03e^{0.03x} - 0.03e^{-0.03x} < 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 0.03e^{0.03x} < 0.03e^{-0.03x} \Leftrightarrow e^{0.03x} < e^{-0.03x} \Leftrightarrow 0.03x < -0.03x \Leftrightarrow 0.03x + 0.03x < 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 0.06x < 0 \Leftrightarrow x < 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f'(x) < 0 &\Leftrightarrow -5 \times (0.03e^{0.03x} - 0.03e^{-0.03x}) < 0 \Leftrightarrow 0.03e^{0.03x} - 0.03e^{-0.03x} > 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 0.03e^{0.03x} > 0.03e^{-0.03x} \Leftrightarrow e^{0.03x} > e^{-0.03x} \Leftrightarrow 0.03x > -0.03x \Leftrightarrow 0.03x + 0.03x > 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 0.06x > 0 \Leftrightarrow x > 0\end{aligned}$$

Quadro de sinal de f' variação de f

x	x_1	0	x_2
$f'(x)$	\backslash\backslash\backslash	+	0
$f(x)$	\backslash\backslash\backslash	\nearrow 25	\searrow \backslash\backslash\backslash

$$f(0) = 35 - 5(e^0 + e^0) = 35 - 10 = 25$$

x_1 e x_2 são as abscissas dos pontos A e B , onde o arco da ponte toca no rio

A altura do arco é máxima quando $x = 0$

12. o ponto de coordenadas $\left(e+1; \frac{e+2}{e+1}\right)$ pertence ao gráfico de g , se e só se, $g(e+1) = \frac{e+2}{e+1}$

$$\begin{aligned} g(e+1) = \frac{e+2}{e+1} &\Leftrightarrow e^{\ln(e+1+a)-\ln(e+1)} = \frac{e+2}{e+1} \Leftrightarrow e^{\ln(\frac{e+1+a}{e+1})} = \frac{e+2}{e+1} \Leftrightarrow \frac{e+1+a}{e+1} = \frac{e+2}{e+1} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow e+1+a = e+2 \Leftrightarrow a = 1 \end{aligned}$$

Resposta:(A)

13. .

13.1. $0 \in D_h$ e é ponto aderente de D_h

A função h é contínua em $x = 0$, se existir $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$, ou seja, se $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = h(0)$ e $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = h(0)$

Ora,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x - 1}{1 - e^{2x}} = \stackrel{(0/0)}{\lim_{x \rightarrow 0^-}} \frac{\frac{e^x - 1}{x}}{\frac{e^{2x} - 1}{x}} = - \frac{\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x - 1}{x}}{2 \times \lim_{2x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} - 1}{2x}} = \\ &= - \frac{1}{2 \times 1} = - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Utilizou-se o limite notável $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{x+1}}{x} = \stackrel{(0/0)}{\lim_{x \rightarrow 0^+}} \frac{(1 - \sqrt{x+1})(1 + \sqrt{x+1})}{x(1 + \sqrt{x+1})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - (\sqrt{x+1})^2}{x(1 + \sqrt{x+1})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - |x+1|}{x(1 + \sqrt{x+1})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - (x+1)}{x(1 + \sqrt{x+1})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - x - 1}{x(1 + \sqrt{x+1})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{x(1 + \sqrt{x+1})} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + \sqrt{x+1}} = - \frac{1}{2} \\ h(0) &= - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Como, $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = h(0)$ e $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = h(0)$, então, existe $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$

Logo, a função h é contínua em $x = 0$

13.2. Calculemos $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \sqrt{x+1}}{x} = (\infty) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x} = \frac{1}{+\infty} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x+1}{x^2}} = \\ &= 0 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x}{x^2} + \frac{1}{x^2}} = -\sqrt{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2}} = -\sqrt{\frac{1}{+\infty} + \frac{1}{+\infty}} = -\sqrt{0+0} = 0\end{aligned}$$

Logo, a reta de equação $y = 0$ é assintota horizontal ao gráfico de h , quando $x \rightarrow +\infty$

Portanto, $b = 0$

14. $f'(x) = (\ln(x^2))' = \frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}$

Assim,

$$f'(a) = \frac{2}{a} > 0, \text{ visto que } a > 0$$

$$f''(x) = \left(\frac{2}{x}\right)' = \frac{2' \times x - 2 \times x'}{x^2} = -\frac{2}{x^2}$$

$$f''(a) = -\frac{2}{a^2} < 0, \text{ visto que } a > 0$$

Por outro lado sabemos, por observação do gráfico da função g , que,

$$g(a) < 0 ; g'(a) < 0 \text{ e } g''(a) > 0$$

Portanto

- (A) $f'(a) \times g''(a) > 0$, é proposição verdadeira
- (B) $f'(a) \times g'(a) < 0$, é proposição verdadeira
- (C) $f''(a) + g(a) < 0$, é proposição verdadeira
- (D) $f''(a) - g''(a) > 0$, é proposição falsa

Resposta:(D)

$$\begin{aligned}15. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x) \cos(2x)}{f(x) - 2} &= (\frac{0}{0}) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{f(x) - 2} \times \lim_{x \rightarrow 0} (\cos(2x)) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \times \frac{\sin(2x)}{2x}}{\frac{f(x) - f(0)}{x}} \times 1 = \\ &= 2 \times \frac{\lim_{2x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{2x}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}} = 2 \times \frac{1}{\frac{1}{2}} = 4\end{aligned}$$

Utilizou-se o limite notável $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

Outro processo

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x) \cos(2x)}{f(x) - 2} &= (\frac{0}{0}) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \times 2 \sin(2x) \cos(2x)}{f(x) - 2} = \frac{1}{2} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2 \times 2x)}{f(x) - 2} = \frac{1}{2} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{f(x) - 2} = \\ &= \frac{1}{2} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \times \frac{\sin(4x)}{4x}}{\frac{f(x) - f(0)}{x}} = \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{\lim_{4x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{4x}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}} = 2 \times \frac{1}{2} = 4 \end{aligned}$$

Utilizou-se o limite notável $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

16. Como o ponto C tem a mesma abscissa do ponto B e a mesma ordenada do ponto A , então o triângulo $[ABC]$ é retângulo em C

Ora,

$$\begin{aligned} f(a) &= \ln(a) \\ f(2a) &= \ln(2a) \end{aligned}$$

A área do triângulo $[ABC]$ é dada por

$$\begin{aligned} A_{[ABC]} &= \frac{\overline{AC} \times \overline{BC}}{2} = \frac{|2a - a| \times |f(2a) - f(a)|}{2} = \frac{a \times |\ln(2a) - \ln(a)|}{2} = \frac{a \times |\ln(2) + \ln(a) - \ln(a)|}{2} = \\ &= \frac{a \times |\ln(2)|}{2} = \frac{a \ln(2)}{2} \end{aligned}$$

Então,

$$\begin{aligned} A_{[ABC]} = \ln(2)a^2 &\Leftrightarrow \frac{a \ln(2)}{2} = \ln(2)a^2 \Leftrightarrow \frac{a}{2} = a^2 \Leftrightarrow 2a^2 - a = 0 \Leftrightarrow a(2a - 1) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow a = 0 \vee 2a - 1 = 0 \Leftrightarrow a = 0 \vee a = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Como $a > 0$, vem, $a = \frac{1}{2}$